

Einige q-Analoga der Lucas- und Fibonacci-Polynome

Von

Johann Cigler

(Vorgelegt in der Sitzung der math.-nat. Klasse am 21. März 2002
durch das w. M. Johann Cigler)

Abstract

The Lucas polynomials $L_n(x, y) = \sum_{k < n} \binom{n-k}{k} \frac{n}{n-k} x^{n-2k} y^k$ satisfy $L_n(1+x, -x) = 1+x^n$. A simple consequence is the identity $\binom{n-i}{r} + \binom{n-i}{r-i} = \sum_{j < i} (-1)^j \binom{i-j}{j} \frac{i}{i-j} \binom{n-2j}{r-j}$ for the binomial coefficients. In this paper we show first that there exist coefficients $c(i, j, s)$ such that $\left[\begin{smallmatrix} n-i \\ r \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-i \\ r-i \end{smallmatrix} \right] = \sum_{j=0}^i c(i, j, q^n) \left[\begin{smallmatrix} n-2j \\ r-j \end{smallmatrix} \right]$ holds for all integers n, i, r , if $\left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right]$ denotes a q-binomial coefficient. These coefficients are used to define q-analogs of the Lucas polynomials. Corresponding q-Fibonacci polynomials are also introduced. As application recurrences for q-binomial sums are obtained.

Mathematics Subject Classifications: 05A10, 05A30, 11B37, 11B39, 11B65.

Keywords: q-Analog, Lucas polynomial, Fibonacci polynomial, binomial coefficient, binomial sum, difference operator, recurrence.

0. Einleitung

Die Lucas-Polynome

$$L_n(x, y) = \sum_{k < n} \binom{n-k}{k} \frac{n}{n-k} x^{n-2k} y^k \quad (1)$$

sind durch die Rekurrenz

$$L_n(x, y) = xL_{n-1}(x, y) + yL_{n-2}(x, y) \quad (2)$$

und die Anfangswerte

$$L_0(x, y) = 2, \quad L_1(x, y) = x \quad (3)$$

charakterisiert. Sie können auch durch die Formel von Binet

$$L_n(x, y) = \left(\frac{x + \sqrt{x^2 + 4y}}{2} \right)^n + \left(\frac{x - \sqrt{x^2 + 4y}}{2} \right)^n \quad (4)$$

dargestellt werden. (vgl. z.B. [5], 5.75). Sie sind Polynome vom Grad n in x . Ersetzt man x durch $1 + x$ und y durch $-x$ in (4) so ergibt sich

$$L_n(1 + x, -x) = 1 + x^n. \quad (5)$$

Analog sind die Fibonacci-Polynome

$$F_n(x, y) = \sum_{k \leq (n-1)/2} \binom{n-1-k}{k} x^{n-1-2k} y^k \quad (6)$$

durch dieselbe Rekurrenz und die Anfangswerte

$$F_0(x, y) = 0, \quad F_1(x, y) = 1 \quad (7)$$

charakterisiert.

Für sie ergibt die Formel von Binet

$$F_n(x, y) = \frac{\left(\frac{x + \sqrt{x^2 + 4y}}{2} \right)^n - \left(\frac{x - \sqrt{x^2 + 4y}}{2} \right)^n}{\sqrt{x^2 + 4y}}. \quad (8)$$

Sie sind Polynome vom Grad $n - 1$ in x . Ersetzt man x durch $1 + x$ und y durch $-x$ in (8) so ergibt sich

$$F_n(1 + x, -x) = \frac{x^n - 1}{x - 1} = 1 + x + \dots + x^{n-1}$$

und daher auch

$$F_n(1 + x, -x) - xF_{n-1}(1 + x, -x) = \frac{x^n - 1}{x - 1} - x \frac{x^{n-1} - 1}{x - 1} = 1.$$

Betrachtet man den Vektorraum aller Funktionen f auf den natürlichen Zahlen und definiert man den Verschiebungsoperator E und den Differenzenoperator $\Delta = E - 1$ wie üblich durch $Ef(n) = f(n + 1)$ und $\Delta f(n) = f(n + 1) - f(n)$, dann gilt also $L_i(E, -\Delta) = I + \Delta^i$ und $F_i(E, -\Delta) = I + \Delta + \dots + \Delta^{i-1}$, sowie $F_i(E, -\Delta) - \Delta F_{i-1}(E, -\Delta) = I$, wenn I die Identität bedeutet. Für $f(n) = \binom{n}{r}$ mit $r \in \mathbb{N}$ reduzieren sich diese Formeln auf

$$\binom{n}{r} + \binom{n}{r-i} = L_i(E, -\Delta) \binom{n}{r}$$

oder anders ausgedrückt auf

$$\binom{n-i}{r} + \binom{n-i}{r-i} = \sum_{j < i} (-1)^j \binom{i-j}{j} \frac{i}{i-j} \binom{n-2j}{r-j}, \quad (9)$$

sowie

$$\sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^j \binom{i-j}{j} \binom{n+i-2j}{r-j} = \sum_{j=0}^{i-1} \binom{n}{r-j}. \quad (10)$$

Aus $F_i(E, -\Delta) - \Delta F_{i-1}(E, -\Delta) = I$ ergibt sich die konkrete Darstellung von $\binom{n}{r}$ als Linearkombination der Polynome $\binom{n+i-j}{r - \lceil \frac{j}{2} \rceil}$, $0 \leq j < i$, nämlich

$$\begin{aligned} \binom{n}{r} &= \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^j \binom{i-j}{j} \binom{n+i-2j}{r-j} - \\ &\quad - \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor} (-1)^j \binom{i-j-1}{j} \binom{n+i-2j-1}{r-j-1}. \end{aligned} \quad (11)$$

Unser Ziel besteht darin, solche q-Analoga der Lucas- und Fibonacci-Polynome zu finden, die auch q-Analoga der obigen Formeln liefern. Wir betrachten dabei q wahlweise als eine Unbestimmte bzw als komplexe Zahl.

Es zeigt sich, dass man dabei im Fall der Lucas-Polynome als q-Analogen der Binomialkoeffizienten die q-Binomialkoeffizienten $\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}$ und im anderen Fall die modifizierten q-Binomialkoeffizienten $q^{\binom{r}{2}} \begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}$ wählen muss.

1. q-Lucas- und q-Fibonacci-Polynome

Satz 1. *Es gibt Koeffizienten $c(i, j, q^n)$, die unabhängig von r sind, so dass gilt*

$$\begin{bmatrix} n-i \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-i \\ r-i \end{bmatrix} = \sum_{j=0}^i c(i, j, q^n) \begin{bmatrix} n-2j \\ r-j \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Wir zeigen zuerst, dass die Formel für $i = 1$ gilt.

In diesem Fall verifiziert man mittels der Rekurrenzrelationen für die q -Binomialkoeffizienten (vgl. z.B. [1] oder [2]) die Identität

$$\begin{bmatrix} n-1 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ r-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} - (q^{n-1} - 1) \begin{bmatrix} n-2 \\ r-1 \end{bmatrix}.$$

Es ist also $c(1, 0, q^n) = 1$, $c(1, 1, q^n) = 1 - q^{n-1} = 1 - \frac{q^n}{q}$.

Für $i = 0$ haben wir $c(0, 0, q^n) = 2$.

Nun wenden wir Induktion an:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} n-i-1 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-i-1 \\ r-i-1 \end{bmatrix} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} n-1-i \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1-i \\ r-i \end{bmatrix} \right\} \\ & \quad - \begin{bmatrix} n-2-(i-1) \\ r-1-(i-1) \end{bmatrix} \\ & \quad + \left\{ \begin{bmatrix} n-1-i \\ r-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1-i \\ r-1-i \end{bmatrix} \right\} - \begin{bmatrix} n-2-(i-1) \\ r-1 \end{bmatrix} = \\ &= \sum c(i, j, q^{n-1}) \begin{bmatrix} n-1-2j \\ r-j \end{bmatrix} + \\ & \quad + \sum c(i, j, q^{n-1}) \begin{bmatrix} n-1-2j \\ r-1-j \end{bmatrix} - \\ & \quad - \sum c(i-1, j, q^{n-2}) \begin{bmatrix} n-2-2j \\ r-1-j \end{bmatrix} = \\ &= \sum c(i, j, q^{n-1}) \left\{ \begin{bmatrix} n-2j-1 \\ r-j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-2j-1 \\ r-1-j \end{bmatrix} \right\} \\ & \quad - \sum c(i-1, j, q^{n-2}) \begin{bmatrix} n-2-2j \\ r-1-j \end{bmatrix} = \\ &= \sum c(i, j, q^{n-1}) \left\{ \begin{bmatrix} n-2j \\ r-j \end{bmatrix} - \right. \\ & \quad \left. - (q^{n-2j-1} - 1) \begin{bmatrix} n-2j-2 \\ r-1-j \end{bmatrix} \right\} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \sum c(i-1, j, q^{n-2}) \begin{bmatrix} n-2-2j \\ r-1-j \end{bmatrix} = \\
& = \sum \begin{bmatrix} n-2j \\ r-j \end{bmatrix} (c(i, j, q^{n-1}) - \\
& \quad - (q^{n-2j+1} - 1)c(i, j-1, q^{n-1}) - \\
& \quad - c(i-1, j-1, q^{n-2})).
\end{aligned}$$

Dabei haben wir für $\begin{bmatrix} n-2j-1 \\ r-j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-2j-1 \\ r-1-j \end{bmatrix}$ nach Induktionsvoraussetzung ($i=1$) den Ausdruck $\begin{bmatrix} n-2j \\ r-j \end{bmatrix} - (q^{n-2j-1} - 1)$ $\begin{bmatrix} n-2j-2 \\ r-1-j \end{bmatrix}$ eingesetzt.

Somit ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}
c(i+1, j, q^n) & = \\
& = c(i, j, q^{n-1}) - (q^{n-2j+1} - 1)c(i, j-1, q^{n-1}) - \\
& \quad - c(i-1, j-1, q^{n-2}).
\end{aligned}$$

Ersetzen wir q^n durch s , so erhalten wir für die Folge der Koeffizienten $c(i, j, s) = c(i, j, s, q)$

$$\begin{aligned}
c(i, j, s, q) & = c\left(i-1, j, \frac{s}{q}, q\right) - \left(\frac{s}{q^{2j-1}} - 1\right)c\left(i-1, j-1, \frac{s}{q}, q\right) - \\
& \quad - c\left(i-2, j-1, \frac{s}{q^2}, q\right) \tag{13}
\end{aligned}$$

mit den Anfangswerten

$$\begin{aligned}
c(0, 0, s, q) & = 2, \quad c(0, j, s, q) = 0, \quad j > 0, \\
c(1, 0, s, q) & = 1, \quad c(1, 1, s, q) = 1 - \frac{s}{q}, \quad c(1, j, s, q) = 0, \quad j > 1, \\
c(2, 0, s, q) & = 1, \quad c(2, 1, s, q) = -(q+1)\frac{s}{q^2}, \\
c(2, 2, s, q) & = \left(\frac{s}{q^2} - 1\right)\left(\frac{s}{q^3} - 1\right). \tag{14}
\end{aligned}$$

Bemerkung 1. Setzt man bei festem n und i in (12) $r = 0, 1, \dots, i$, dann erhält man $i + 1$ Gleichungen für die Koeffizienten, die eine eindeutige Lösung besitzen, weil der Koeffizient von $c(i, r, q^n)$ jeweils 1 ist. Damit erhält man eine weitere Methode, die Koeffizienten zu berechnen. Man verifiziert damit sehr leicht, dass

$$c(i, 0, s, q) = 1, \quad i \geq 1,$$

$$c(i, 1, s, q) = -\frac{s[i]}{q^i}, \quad i \geq 2,$$

$$c(i, 2, s, q) = \frac{s\left(q^i[i] - s\left[\begin{smallmatrix} i \\ 2 \end{smallmatrix}\right]\right)}{q^{2i+1}}, \quad i \geq 3,$$

$$c(i, 3, s, q) = -\left[\begin{smallmatrix} i \\ 3 \end{smallmatrix}\right] \frac{s}{q^i} \frac{s}{q^{i+1}} \frac{s}{q^{i+2}} + \frac{s}{q^{i+1}} \frac{s}{q^{i+2}} [i][i-2] - \frac{s}{q^{i+2}} [i], \quad i \geq 4,$$

gilt.

Man wird daher dazu geführt, $c(i, j, s, q)$ in der Form

$$c(i, j, s, q) = \sum_{k=0}^j b(i, j, k, q) q^{\binom{k+1}{2} - k(i+j)} s^k$$

zu schreiben. Dann ergibt sich aus (13) durch Koeffizientenvergleich

$$b(i, j, k, q) = b(i-1, j, k, q) - q^{i-j} b(i-1, j-1, k-1, q) + q^k b(i-1, j-1, k, q) - q^k b(i-2, j-1, k, q) \quad (15)$$

mit den Anfangswerten

$$b(0, 0, 0, q) = 2, b(1, 0, 0, q) = 1, b(1, 1, 0, q) = 1, b(1, 1, 1, q) = -1.$$

Überraschenderweise gibt es für die $b(i, j, k, q)$ eine explizite Formel. Computorexperimente lassen vermuten, dass für $i > 0$

$$b(i, j, k, q) = (-1)^k \left[\begin{smallmatrix} i-j+k-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} j-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right] \frac{[i]}{[i-j]}, \quad j \neq i,$$

und

$$b(i, i, k, q) = (-1)^k \left[\begin{smallmatrix} i \\ k \end{smallmatrix} \right]$$

gilt. Das lässt sich aber mit Induktion leicht verifizieren.

Wir können nun eine Klasse von q-Lucas Polynomen, die noch von einem zusätzlichen Parameter s abhängen, definieren durch

$$L_n(x, y, s) = \sum_{j=0}^n (-1)^j c(n, j, s, q) x^{n-2j} y^j. \quad (16)$$

Dann ist $L_n(x, y, s)$ ein Polynom in x und x^{-1} vom Grad n und erfüllt die Rekursion

$$\begin{aligned} L_n(x, y, s) &= \left(x - \frac{y}{x}\right) L_{n-1}\left(x, y, \frac{s}{q}\right) + \frac{sy}{q^n x} L_{n-1}\left(qx, y, \frac{s}{q}\right) + \\ &+ y L_{n-2}\left(x, y, \frac{s}{q^2}\right) \end{aligned} \quad (17)$$

bzw

$$\begin{aligned} L_n(x, y, s) &= \left(x - \frac{y}{x}\right) L_{n-1}\left(x, y, \frac{s}{q}\right) + \frac{sy}{qx} L_{n-1}\left(x, \frac{y}{q^2}, \frac{s}{q}\right) + \\ &+ y L_{n-2}\left(x, y, \frac{s}{q^2}\right) \end{aligned} \quad (18)$$

mit den Anfangswerten

$$L_0(x, y, s) = 2, \quad L_1(x, y, s) = x + \left(\frac{s}{q} - 1\right) \frac{y}{x}. \quad (19)$$

Wir bezeichnen die $L_n(x, y, s)$ als **allgemeine q-Lucas-Polynome**. Für $s = q = 1$ reduziert sich das auf die Rekursion der klassischen Lucas Polynome $L_n(x, y) = xL_{n-1}(x, y) + yL_{n-2}(x, y)$ mit den Anfangswerten $L_0(x, y) = 2, L_1(x, y) = x$.

Für $q = 1$ und beliebiges s erhalten wir die Polynome $L_n\left(x + (s-1)\frac{y}{x}, y, s\right)$, aus welchen leicht ersichtlich ist, dass die Koeffizienten $c(i, j, s, 1)$ sich auch in der Form

$$(-1)^j c(i, j, s, 1) = \sum_k \binom{i-j+k}{k} \binom{i-j}{j-k} \frac{i}{i-j+k} (s-1)^k$$

schreiben lassen.

Ein geeignetes q-Analogon ergibt sich durch den Ansatz

$$(-1)^j c(i, j, s, q) = \sum_{k=0}^i d(i, j, k, q) \left(\frac{s}{q^i} - 1\right) \cdots \left(\frac{s}{q^{i+k-1}} - 1\right).$$

Dann ergibt sich durch Koeffizientenvergleich für die $d(i, j, k)$ die Rekursion

$$\begin{aligned} d(i, j, k, q) &= d(i-1, j, k, q) - d(i-1, j-1, k, q) + \\ &\quad + d(i-2, j-1, k, q) + \\ &\quad + q^{i-2j+k} d(i-1, j-1, k-1, q) + \\ &\quad + q^{i-2j+k+1} d(i-1, j-1, k, q). \end{aligned}$$

Beachtet man, dass $d(i, j, k, q)$ nur dann von 0 verschieden sein kann, wenn $0 \leq k \leq j \leq i$ ist und dass die Anfangsbedingungen durch

$$\begin{aligned} d(0, 0, 0, q) &= 2, \quad d(1, 0, 0, q) = 1, \quad d(1, 1, 0, q) = 0, \quad d(1, 1, 1, q) = 1, \\ d(2, 0, 0, q) &= 1, \quad d(2, 1, 0, q) = d(2, 1, 1, q) = 1 + q, \\ d(2, 2, 0, q) &= d(2, 2, 1, q) = 0, \quad d(2, 2, 2, q) = 1 \end{aligned}$$

gegeben sind, so verifiziert man leicht, dass für $0 \leq k \leq j \leq i$ wieder ein explizites q -Analogon gilt, nämlich

$$d(i, j, k, q) = \begin{bmatrix} i-j+k \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-j \\ j-k \end{bmatrix} \frac{[i]}{[i-j+k]} q^{\binom{j-k}{2}}.$$

Setzen wir

$$Luc_n(x, y) = L_n(x, y, q^n), \quad (20)$$

so erhalten wir die **speziellen q -Lucas-Polynome** mit der Rekurrenz

$$\begin{aligned} Luc_n(x, y) &= \left(x - \frac{y}{x}\right) Luc_{n-1}(x, y) + \frac{y}{x} Luc_{n-1}(qx, y) + \\ &\quad + y Luc_{n-2}(x, y) \end{aligned}$$

mit den Anfangswerten $Luc_0(x, y) = 2$, $Luc_1(x, y) = x$. Beachtet man, dass der q -Differentiationsoperator D durch $Df(x) = \frac{f(qx) - f(x)}{(q-1)x}$ gegeben ist, so schreibt sich die Rekursion für die speziellen q -Lucaspolynome in der Form

$$\begin{aligned} Luc_n(x, y) &= (x Luc_{n-1}(x, y) + (q-1)yD) Luc_{n-1}(x, y) + \\ &\quad + y Luc_{n-2}(x, y) \end{aligned} \quad (21)$$

mit den Anfangswerten

$$Luc_0(x, y) = 2, \quad Luc_1(x, y) = x. \quad (22)$$

Daraus ist ersichtlich, dass diese Polynome tatsächlich Polynome in x sind vom Grad n .

Man verifiziert leicht durch Koeffizientenvergleich, dass sich dabei das genaue Analogon der klassischen Lucaspolynome

$$Luc_n(x, y) = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{[n]}{[n-j]} \begin{bmatrix} n-j \\ j \end{bmatrix} q^{\binom{j}{2}} x^{n-2j} y^j \quad (23)$$

ergibt.

Wir definieren ganz analog die **allgemeinen q-Fibonacci-Polynome** durch eine analoge Rekursion

$$F_n(x, y, s) = \left(x - \frac{y}{x}\right) F_{n-1}\left(x, y, \frac{s}{q}\right) + \frac{sy}{q^{n-1}x} F_{n-1}\left(qx, y, \frac{s}{q}\right) + y F_{n-2}\left(x, y, \frac{s}{q^2}\right)$$

mit den Anfangswerten $F_0(x, y, s) = 0$, $F_1(x, y, s) = 1$.

Wir schreiben wieder

$$F_n(x, y, s) = \sum_{j=0}^{(n-1)/2} a(n, j, s, q) (-1)^j x^{n-1-2j} y^j.$$

Dann ergibt sich

$$a(n, j, s, q) = \sum_{k=0}^j \begin{bmatrix} n-j+k-1 \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j \\ k \end{bmatrix} q^{-k(n+j)+\binom{k+1}{2}} (-s)^k,$$

wobei $a(n, n, s, q) = 0$ sein soll.

Eine andere Darstellung ist wieder gegeben durch

$$a(n, j, s, q) = (-1)^j \sum_{k=0}^j \begin{bmatrix} n-1-j+k \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n-1-j \\ j-k \end{bmatrix} \times \\ \times q^{\binom{j-k+1}{2}} \prod_{i=0}^{k-1} \left(\frac{s}{q^{n+i}} - 1\right).$$

Weiters definieren wir die **speziellen q-Fibonacci-Polynome** durch

$$Fib_n(x, y) = x Fib_{n-1}(x, y) + (q-1)y DFib_{n-1}(x, y) + y Fib_{n-2}(x, y) \quad (24)$$

mit den Anfangswerten

$$Fib_0(x, y) = 0, \quad Fib_1(x, y) = 1. \quad (25)$$

Dann verifiziert man sofort, dass

$$Fib_n(x, y) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \begin{bmatrix} n-k-1 \\ k \end{bmatrix} q^{\binom{k+1}{2}} x^{n-1-2k} y^k \quad (26)$$

gilt.

Man beachte, dass das ein anderes q -Analogon der Fibonaccipolynome ist als das in [4] betrachtete, für welches

$$F_n(x, y) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \begin{bmatrix} n-k-1 \\ k \end{bmatrix} q^{2\binom{k}{2}} x^{n-1-2k} y^k$$

gilt.

Aus (23) ergibt sich sofort, dass

$$DLuc_n(x, y) = [n] Fib_n\left(x, \frac{y}{q}\right) \quad (27)$$

gilt. Außerdem ist $Luc_n(x, y) = Fib_{n+1}(x, y) + yFib_{n-1}(x, y)$.

Man kann beide Polynome auf negative Indizes erweitern unter Beibehaltung der Rekurrenz. Es ergibt sich

$$Fib_{-n}(x, y) = (-1)^{n-1} \frac{Fib_n(x, y)}{y^n}$$

bzw

$$Luc_{-n}(x, y) = (-1)^n \frac{Luc_n(x, y)}{y^n}.$$

2. Verwandte Fragestellungen

Nun wollen wir Rekurrenzen für Summen der Gestalt

$$s(n, i, z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \begin{bmatrix} n \\ \lfloor \frac{n+ik}{2} \rfloor \end{bmatrix} z^k \quad (28)$$

herleiten und damit eine Formel aus [3] verallgemeinern. Es gilt

$$\begin{aligned} \sum c(i, j, q^n) E^{-2j} \begin{bmatrix} n \\ \lfloor \frac{n+ik}{2} \rfloor \end{bmatrix} &= \sum c(i, j, q^n) \begin{bmatrix} n-2j \\ \lfloor \frac{n+ik}{2} \rfloor - j \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} n-i \\ \lfloor \frac{n-i+i(k+1)}{2} \rfloor \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-i \\ \lfloor \frac{n-i+i(k-1)}{2} \rfloor \end{bmatrix} \end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned} \sum c(i, j, q^n) s(n-2j, i, z) &= \sum \left[\binom{n-i}{\lfloor \frac{n-i+i(k+1)}{2} \rfloor} \right] z^k + \sum \left[\binom{n-i}{\lfloor \frac{n-i+i(k-1)}{2} \rfloor} \right] z^k = \\ &= \left(z + \frac{1}{z} \right) s(n-i, i, z). \end{aligned}$$

Das lässt sich auch folgendermaßen formulieren:

Satz 2. Die Folge der Polynome $s(n, i, z) \in \mathbb{C}(q)[x, x^{-1}]$ genügt der Rekursion

$$\left(L_i(1, -E^{-2}, q^n) - \left(z + \frac{1}{z} \right) E^{-i} \right) s(n, i, z) = 0. \quad (29)$$

Bemerkung 2. Im Fall $q = 1$ sind die Operatoren $L_i(1, -E^{-2}, 1)$ unabhängig von n . Die $s(n, i, z)$ genügen also einer Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten. Das ist im allgemeinen Fall nicht mehr richtig.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass im Fall $q = 1$ die Ordnung des annihilierenden Operators i ist, während sie im allgemeinen Fall $2i$ beträgt.

Wir wollen nun eine andere Version unserer Resultate angeben. Setzt man $q^r = x$ und $q^n = s$, so ergibt sich nach leichter Rechnung

$$\frac{\begin{bmatrix} n-k \\ r-j \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}} = \frac{\prod_{m=0}^{j-1} \left(\frac{x}{q^m} - 1 \right) \prod_{l=0}^{k-j-1} \left(\frac{s}{xq^l} - 1 \right)}{\prod_{p=0}^{k-1} \left(\frac{s}{q^p} - 1 \right)} \quad \text{für } 0 \leq j \leq k.$$

Daher lässt sich Formel (12) auch in der folgenden Gestalt schreiben:

$$\frac{\prod_{k=0}^{i-1} \left(\frac{s}{q^k x} - 1 \right)}{\prod_{k=0}^{i-1} \left(\frac{s}{q^k} - 1 \right)} + \frac{\prod_{k=0}^{i-1} \left(\frac{x}{q^k} - 1 \right)}{\prod_{k=0}^{i-1} \left(\frac{s}{q^k} - 1 \right)} = \sum_{j=0}^i c(i, j, s, q) \varphi_j(x, s) \quad (30)$$

mit $\varphi_n(x, s) = \frac{\prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{x}{q^k} - 1 \right) \left(\frac{s}{q^k x} - 1 \right)}{\prod_{l=0}^{2n-1} \left(\frac{s}{q^l} - 1 \right)}$.

Bemerkung 3. Gleichung (30) kann für komplexes q als Funktion der komplexen Variablen s interpretiert werden. Für $m \geq i$ ist die linke Seite im Punkt $s = q^m$ regulär. Daher muss auch die rechte Seite regulär sein. Das ist nur dann möglich, wenn für $2j - 1 \geq i$ das Polynom $c(i, j, s, q)$ jedes q^m mit $i \leq m \leq 2j - 1$ als Nullstelle besitzt.

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass $c(i, j, s, q)$ durch $\prod_{m=i}^{2j-1} (s - q^m)$ teilbar ist.

Genauer gilt

$$c(i, i-j, s, q) = (-1)^i c\left(i, j, \frac{s}{q^{i-2j}}, q\right) \prod_{k=i}^{2i-2j-1} \left(\frac{s}{q^k} - 1\right), 0 \leq j \leq \frac{i}{2}.$$

Denn das ist gleichbedeutend mit

$$b(i, i-j, k, q) = \sum_{l=0}^i b(i, j, l, q) \begin{bmatrix} i-2j \\ k-l \end{bmatrix} (-1)^{k-l} q^{(j-l)(k-l)}$$

und das ist wieder äquivalent mit

$$\begin{bmatrix} j+k-1 \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-j \\ k \end{bmatrix} \frac{[k]}{[j]} = \sum_{l=0}^j \begin{bmatrix} i-j+l-1 \\ l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j-1 \\ l-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-2j \\ k-l \end{bmatrix} q^{(j-l)(k-l)}.$$

Um diese Formel zu beweisen, gehen wir folgendermaßen vor. Aus dem q -Analogon der Formel von Saalschütz (vgl. zB [1], p.524) folgt

$${}_2\varphi_3 \left(\begin{matrix} q^{1-j}, q^{1+i-j}, q^{1-k} \\ q^2, q^{2+i-2j-k} \end{matrix} \middle| q, q \right) = \frac{(q^{1+j}; q)_{k-1} (q^{1-i+j}; q)_{k-1}}{(q^2; q)_{k-1} (q^{2j-i}; q)_{k-1}}.$$

Die linke Seite bedeutet

$$\sum_m \frac{(q^{1-j}; q)_{m-1} (q^{1+i-j}; q)_{m-1} (q^{1-k}; q)_{m-1}}{(q^2; q)_{m-1} (q^{2+i-2j-k}; q)_{m-1} (q; q)_{m-1}} q^{m-1}.$$

Sie kann auch folgendermaßen geschrieben werden:

$$q^{-(k-1)(j-1)} \frac{[k-1]![1+i-2j+k]!}{[i-2j]![i-j]!} \cdot \sum_m \begin{bmatrix} j-1 \\ m-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-j+m-1 \\ m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-2j \\ k-m \end{bmatrix} q^{(j-m)(k-m)}$$

Die rechte Seite schreiben wir in der Gestalt

$$\begin{bmatrix} j+k-1 \\ k \end{bmatrix} \frac{[k]}{[j]} \begin{bmatrix} i-j \\ k \end{bmatrix} \frac{[1+i-2j+k]![k-1]!}{[i-2j]![i-j]!} q^{-(j-1)(k-1)}.$$

Vergleicht man die beiden Seiten, so ergibt sich die gewünschte Formel.

Die linke Seite von (30) ist eine Linearkombination von Termen der Gestalt $f_n(x, s) = x^n + \left(\frac{s}{x}\right)^n$. Jeder solche Term hat ebenfalls eine Entwicklung der angegebenen Form.

Satz 3. *Es existieren eindeutig bestimmte Koeffizienten $g(n, j, s, q)$, sodass gilt*

$$f_n(x, s) = \sum_{j=0}^n g(n, j, s, q) \varphi_j(x, s). \quad (31)$$

Beweis. Es ist

$$f_n(x, s) = \left(x + \frac{s}{x}\right) f_{n-1}(x, s) - s f_{n-2}(x, s)$$

mit den Anfangswerten $f_0(x, s) = 2, f_1(x, s) = x + \frac{s}{x}$.

Wir haben

$$f_0(x, s) = 2\varphi_0(x, s)$$

und

$$f_1(x, s) = (s+1)\varphi_0(x, s) - (s-1)\left(\frac{s}{q} - 1\right)\varphi_1(x, s).$$

Nun ist

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{s}{x}\right) \varphi_n(x, s) &= q^n \left(\frac{s}{q^{2n}} + 1\right) \varphi_n(x, s) - \\ &\quad - q^n \left(\frac{s}{q^{2n}} - 1\right) \left(\frac{s}{q^{2n+1}} - 1\right) \varphi_{n+1}(x, s). \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich mit Induktion sofort die Behauptung.

Für die Koeffizienten ergibt sich die Rekursion

$$\begin{aligned} g(n, j, s, q) &= q^j \left(\frac{s}{q^{2j}} + 1\right) g(n-1, j, s, q) - \\ &\quad - q^{j-1} \left(\frac{s}{q^{2j-2}} - 1\right) \left(\frac{s}{q^{2j-1}} - 1\right) g(n-1, j-1, s, q) - \\ &\quad - s g(n-2, j, s, q). \end{aligned}$$

Bemerkung 4. *Da die linke Seite von (31) ein Polynom in s ist, ergibt sich wie in Bemerkung 3, dass $g(n, j, s, q)$ für $j > 0$ durch $\prod_{m=0}^{2j-1} (s - q^m)$ teilbar ist. Genauer kann man mit Induktion zeigen, dass*

$$g(n, j, s, q) = l(n, j, s, q) \prod_{m=0}^{2j-1} \left(\frac{s}{q^m} - 1\right) \text{ ist, wobei}$$

$$l(n, 0, s, q) = 1 + q^n \text{ und für } j > 0$$

$$l(n, j, s, q) = (-1)^j \sum_{k=0}^{n-1} \frac{[n]}{[n-k]} \begin{bmatrix} n-k \\ j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k+j-1 \\ j-1 \end{bmatrix} q^{\binom{j}{2} - jk} s^k$$

ist.

Aus Satz 3 folgt, dass jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathbb{C}[x, x^{-1}]$ vom Grad n mit $f(x) = f\left(\frac{s}{x}\right)$ als Linearkombination der Polynome φ_j , $0 \leq j \leq n$, darstellbar ist.

So gibt es beispielsweise Koeffizienten $h(i, m, j, s)$ mit

$$x^i \frac{\prod_{k=0}^{m-1} \left(\frac{s}{q^k x} - 1\right)}{\prod_{k=0}^{m-1} \left(\frac{s}{q^k} - 1\right)} + \left(\frac{s}{x}\right)^i \frac{\prod_{k=0}^{m-1} \left(\frac{x}{q^k} - 1\right)}{\prod_{k=0}^{m-1} \left(\frac{s}{q^k} - 1\right)} = \sum_{j=0}^{\max(i, m)} h(i, m, j, s) \varphi_j(x, s).$$

Bei festem m erfüllt $h(i, m, j, s)$ dieselbe Rekursion wie $g(i, j, s)$. Beispielsweise ergeben sich für $m = 2$ nun die folgenden Anfangswerte:

$$h(0, 2, 0, s) = 1, \quad h(0, 2, 1, s) = -\frac{(1+q)s}{q^2},$$

$$h(0, 2, 2, s) = \frac{(s-q^2)(s-q^3)}{q^5}$$

und

$$h(1, 2, 0, s) = 1, \quad h(1, 2, 1, s) = -\left(1 + \frac{s}{q}\right).$$

Setzt man

$$s(n, i, 2m, z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left[\begin{matrix} n \\ \lfloor \frac{n+2mk}{2} \rfloor \end{matrix} \right] q^{im \binom{k}{2}} z^k,$$

so zeigt man genauso wie oben, dass diese Polynome die Rekursion

$$\begin{aligned} & \sum h(i, 2m, j, q^n) s(n-2j, i, 2m, z) = \\ &= \sum \left[\begin{matrix} n-2m \\ \lfloor \frac{n-2m+2m(k+1)}{2} \rfloor \end{matrix} \right] q^{im \binom{k+1}{2} + i \lfloor \frac{n}{2} \rfloor} z^k + \\ &+ \sum \left[\begin{matrix} n-2m \\ \lfloor \frac{n-2m+2m(k-1)}{2} \rfloor \end{matrix} \right] q^{im \binom{k-1}{2} + i \lfloor \frac{n+1-2m}{2} \rfloor} z^k = \\ &= \left(q^i \left[\begin{matrix} n+i-2m \\ \lfloor \frac{n+i-2m}{2} \rfloor \end{matrix} \right]_z + q^i \left[\begin{matrix} n \\ \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \end{matrix} \right] \frac{1}{z} \right) s(n-2m, i, 2m, z) \end{aligned}$$

erfüllen.

Für $m = 1$ genügt also

$$s(n, i, 2, z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left[\begin{matrix} n \\ \lfloor \frac{n+2k}{2} \rfloor \end{matrix} \right] q^{i \binom{k}{2}} z^k$$

der Rekursion

$$\sum_j h(i, 2, j, q^n) t(n - 2j, i, z) = \left(q^{i \lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{z} + q^{i \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} z \right) t(n - 2, i, z).$$

Bemerkung 5. Für $q = 1$ reduziert sich $s(n, i, 2, z)$ auf $t(n, z) = \sum \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + k} z^k$ und die Rekursion $t(n, z) = \frac{(z+1)^2}{z} t(n - 2, z)$ mit der expliziten Formel $t(n, z) = \frac{(z+1)^n}{z^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}$.

Im allgemeinen Fall erhalten wir für $i = 1$ ein einfaches q-Analogon:

$$s(2n, 1, 2, z) = \prod_{j=0}^{n-1} (1 + q^j z) \left(1 + \frac{q^{j+1}}{z} \right) \text{ und}$$

$$s(2n + 1, 1, 2, z) = (1 + q^n z) t(2n, 1, z).$$

Im Fall $i = jm$, $j \geq 1$, ergeben sich wieder q-Analoga der Lucas Polynome.

Ich möchte nur ein solches Analogon explizit erwähnen, nämlich den Fall $i = m$.

Hier ergibt sich nach leichter Rechnung

$$h(0, 0, 0, s) = 2, \quad h(1, 1, 0, s) = 1, \quad h(1, 1, 1, s) = \frac{s}{q} - 1$$

und

$$\begin{aligned} h(i, i, j, s) &= q^j h\left(i - 1, i - 1, j, \frac{s}{q}\right) + \\ &+ \left(\frac{s}{q^{2j-1}} - 1\right) q^{j-1} h\left(i - 1, i - 1, j - 1, \frac{s}{q}\right) - \\ &- \frac{s}{q} h\left(i - 2, i - 2, j - 1, \frac{s}{q^2}\right). \end{aligned}$$

Mit diesen Koeffizienten gilt also mit derselben Überlegung wie oben

$$q^{ir} \begin{bmatrix} n - i \\ r \end{bmatrix} + q^{i(n-r)} \begin{bmatrix} n - i \\ r - i \end{bmatrix} = \sum_{j=0}^i h(i, i, j, q^n) \begin{bmatrix} n - 2j \\ r - j \end{bmatrix}.$$

Im Spezialfall $i = n$ sieht man aus Bemerkung 1, dass wieder

$$h(n, n, j, q^n) = (-1)^j q^{\binom{j}{2}} \frac{[n]}{[n-j]} \begin{bmatrix} n-j \\ j \end{bmatrix}$$

erfüllt ist.

Bemerkung 6. *Man rechnet leicht nach, dass $h(i, i, j, s) = \frac{j!}{q^{j^2}} c(i, j, \frac{1}{s}, \frac{1}{q})$ ist.*

Das sieht man am einfachsten, wenn man in Gleichung (12) q durch $\frac{1}{q}$ ersetzt und beachtet, dass $\left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right]_{\frac{1}{q}} = q^{-nk+k^2} \left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right]_q$ erfüllt ist.

3. Eine weitere Identität für die q-Binomialkoeffizienten

Nun wollen wir q-Analoga der Formeln (9) und (10) finden. Wir betrachten dazu auf dem Vektorraum aller „q-Polynome“

$\sum a_j q^{\binom{j}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ j \end{smallmatrix} \right]$, d.h. aller endlichen Linearkombinationen der q-

Binomialkoeffizienten $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$, deren Koeffizienten rationale Funktionen in der Unbestimmten q sind, den Verschiebungsoperator E , definiert durch $E \left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n+1 \\ r \end{smallmatrix} \right]$ und den q-Differenzenoperator Δ , definiert

durch $\Delta q^{\binom{r}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right] = q^{\binom{r-1}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ r-1 \end{smallmatrix} \right]$.

Wir betrachten dort die Operatoren

$$F_i(n, E, \Delta) = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor} \left[\begin{smallmatrix} i-1-j \\ j \end{smallmatrix} \right] q^{nj} E^{i-1-2j} \Delta^j, \quad (32)$$

die man als Fibonacci-Polynome in E und Δ interpretieren kann.

Dann rechnet man sofort nach, dass

$$F_i(n, E, \Delta) = E F_{i-1}(n, E, \Delta) + q^n F_{i-2}(n, E, \Delta) \Delta \quad (33)$$

gilt.

Satz 4. *Es gibt Konstanten $c(i, j)$, so dass gilt*

$$\begin{aligned} F_{i+1}(n, E, -\Delta) q^{\binom{r}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right] &= \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^j \left[\begin{smallmatrix} i-j \\ j \end{smallmatrix} \right] q^{nj} q^{\binom{r-j}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n+i-2j \\ r-j \end{smallmatrix} \right] = \\ &= \sum_{j=0}^i c(i, j) q^{nj} q^{\binom{r-j}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ r-j \end{smallmatrix} \right]. \end{aligned}$$

Beweis. Wenn solche Konstanten für alle n, r existieren, müssen sie die Gestalt

$$c(i, j) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^k \begin{bmatrix} i-k \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-2k \\ j-k \end{bmatrix} q^{\binom{j-k}{2}} \quad (34)$$

haben. Es ist klar, dass dann $c(i, j) = 0$ für $j > i$ ist.

Setzt man das in die rechte Seite ein, so ergibt sich

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^k \begin{bmatrix} i-k \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i-2k \\ j-k \end{bmatrix} q^{\binom{j-k}{2}} q^{nj} q^{\binom{r-j}{2}} \begin{bmatrix} n \\ r-j \end{bmatrix} = \\ & = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^k \begin{bmatrix} i-k \\ k \end{bmatrix} q^{\binom{r-k}{2}} q^{nk} \times \\ & \quad \times \sum_{j=0}^i q^{nj-nk+j^2-jk-jr+kr} \begin{bmatrix} i-2k \\ j-k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ r-j \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Für die innere Summe ergibt sich nach der q-Vandermonde Formel

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^i q^{nj-nk+j^2-jk-jr+kr} \begin{bmatrix} i-2k \\ j-k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ r-j \end{bmatrix} = \\ & = \sum_{j=k}^i q^{j(j+k+n-r)} \begin{bmatrix} i-2k \\ j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ r-j-k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n+i-2k \\ r-k \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

womit alles bewiesen ist.

Formel (34) für die $c(i, j)$ lässt sich im allgemeinen nicht vereinfachen. Für $q = 1$ reduziert sich natürlich alles auf 1. Dagegen hat Formel (11) ein schönes q-Analogon.

Satz 5. Für jedes $i = 1, 2, 3, \dots$ gilt

$$\begin{aligned} q^{\binom{i}{2}} \begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} &= \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^j \begin{bmatrix} i-j \\ j \end{bmatrix} q^{nj} q^{\binom{r-j}{2}} \begin{bmatrix} n+i-2j \\ r-j \end{bmatrix} - \\ & \quad - \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor} (-1)^j \begin{bmatrix} i-j-1 \\ j \end{bmatrix} q^{n(j+1)} q^{i-2j-1} q^{\binom{r-j-1}{2}} \begin{bmatrix} n+i-2j-1 \\ r-j-1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (35)$$

für alle $n, r \in \mathbb{N}$.

Beweis. Dieselbe Rekurrenz wie $F_i(n, E, \Delta)$ erfüllen auch die Operatoren

$$G_i(n, E, \Delta) = q^n F_i(n, qE, \Delta).$$

Unsere Behauptung lautet nun

$$F_i(n, E, -\Delta) - G_{i-1}(n, E, -\Delta)\Delta = I$$

für alle i .

Aus

$$F_1(n, E, \Delta) = I, \quad G_0(n, E, \Delta) = 0, \quad F_2(n, E, \Delta) = E,$$

$$G_1(n, E, \Delta) = q^n I$$

und der Identität $I = E - q^n \Delta$ folgt, dass die Behauptung für $i = 1, 2$ richtig ist.

Nun ist

$$\begin{aligned} F_i(n, E, -\Delta) - G_{i-1}(n, E, -\Delta)\Delta &= \\ &= (EF_{i-1}(n, E, -\Delta) - q^n F_{i-2}(n, E, -\Delta)\Delta) - \\ &\quad - (EG_{i-2}(n, E, -\Delta) - q^n G_{i-3}(n, E, -\Delta)\Delta)\Delta = \\ &= E(F_{i-1}(n, E, -\Delta) - G_{i-2}(n, E, -\Delta)) - \\ &\quad - q^n (F_{i-2}(n, E, -\Delta) - G_{i-3}(n, E, -\Delta)\Delta)\Delta = \\ &= E - q^n \Delta = I \end{aligned}$$

Damit ist unsere Behauptung bewiesen.

Literatur

- [1] Andrews, G. E., Askey, R., Roy, R. (1999) Special Functions. Cambridge University Press
- [2] Cigler, J. (1979) Operatormethoden für q-Identitäten. – Mh. Math. **88**: 87–105
- [3] Cigler, J. (2001) Recurrences for some sequences of binomial sums. Sitzungsberichte ÖAW **210**: 61–83
- [4] Cigler, J. (2003) q-Fibonacci polynomials. Fibonacci Quarterly **41**: 31–40
- [5] Graham, R. L., Knuth, D. E., Patashnik, O. (1988) Concrete Mathematics

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Johann Cigler, Institut für Mathematik, Universität Wien, Strudlhofgasse 4, A-1090 Wien, Austria.